

●子どもの予防接種【定期接種】

| 種 類 | 対 象 期 間 (対象年齢を過ぎると全額自己負担) | 標準的な接種時期 | 接種回数・間隔 |
|--|------------------------------|---|--|
| ロタ | ロタリックス（1価） 生後6週から24週まで | 初回：生後2か月に至った日から 出生14週6日後までに | ロタリックス（1価）2回 2回目：1回目の接種から27日以上あける |
| | ロタテック（5価） 生後6週から32週まで | | ロタテック（5価）3回 2回目：1回目の接種から27日以上あける 3回目：2回目の接種から27日以上あける |
| BCG（結核） | 1歳になる前日まで | 生後5か月～8か月になる前日まで | 1回 |
| B型肝炎 | 1歳になる前日まで | 生後2か月～9か月になる前日まで | 3回 2回目：1回目の接種から27日以上の間隔をおく。 3回目：1回目の接種から139日以上の間隔をおく。 |
| ヒブ | 2か月～5歳になる前日まで | 初回：2か月～7か月になる前日まで | 最大4回（初回3回、追加1回） （接種時期により回数が異なります） |
| 小児用肺炎球菌 | | | |
| 四種混合（DPT-IPV） 百日せき、ジフテリア、破傷風、 不活化ポリオ | 3か月～7歳6か月になる前日まで | 初回：3か月～1歳になる前日まで 追加：初回3回接種が終了してから 1年～1年6か月の間 | 初回：20日～56日をあけて3回 追加：初回3回接種が終了してから 1年～1年6か月の間に1回 |
| 水痘（みずぼうそう） | 1歳～3歳になる前日まで | 1回目：1歳～1歳3か月になる 前日まで 2回目：1回目の接種から 6か月～12か月の間 | 3か月以上の間隔をおいて2回 |
| 麻しん風しん混合（MR） | 1期：1歳～2歳になる前日まで | 1歳になったら早めに受けましょう | 1回 |
| | 2期：小学校入学前の1年間 | 4月になったら早めに受けましょう | 1回 |
| 日本脳炎 | 1期初回：6か月～7歳6か月になる前日まで | 1期初回：3歳～4歳になる前日まで | 6日～28日間隔をおいて2回 |
| | 1期追加：6か月～7歳6か月になる前日まで | 1期追加：4歳～5歳になる前日まで | 初回（2回）終了後、概ね1年後に1回 |
| | 2期：9歳～13歳になる前日まで | 小学4年生相当 | 1回 |
| 二種混合（DT） （ジフテリア・破傷風） | 11歳～13歳になる前日まで | 小学6年生相当 | 1回 |
| 子宮頸がん予防（HPV） （ヒトパピローマウイルス） | 小学6年生～高校1年生相当の女子 | 中学1年生相当 | 2価サーバリックス：3回 （2回目は1か月後、3回目は1回目から6か月後） 4価ガーダシル：3回 （2回目は2か月後、3回目は1回目から6か月後） |