

予防接種の種類		対象年齢	標準的な接種年齢等	対象年齢 ■ 標準的な接種年齢 ※1												接種回数	備考	
				2か月	4か月	6か月	8か月	10か月	1歳	3歳	5歳	7歳						
定期	ロタウイルス	経口生ワクチン	生後6週～24週	[接種開始] 生後8週～15週未満	↓	↓											2回	1回目接種後、27日以上の間隔をおいて、24週までに2回経口接種 ※初回接種は、生後14週6日までに行うことを推奨
	5価		生後6週～32週	[接種開始] 生後8週～15週未満	↓	↓	↓										3回	1回目接種後、27日以上の間隔をおいて、32週までに3回経口接種 ※初回接種は、生後14週6日までに行うことを推奨
定期	B型肝炎	不活化ワクチン	1歳未満	生後2か月～9か月未満	↓	↓		↓								3回	1回目接種後27日以上の間隔をおいて2回目を接種、3回目は初回から139日以上経過した後に1回接種	
定期	ヒブ (インフルエンザ菌b型)	不活化ワクチン	生後2か月～生後60か月(5歳)未満	[接種開始] 生後2か月～7か月未満	↓	↓	↓							↓		初回 3回 追加 1回	1回目接種後27日～56日の間隔をおいて2回目を接種(3回目も同様) ※初回3回は、生後12か月に至るまでの間に接種 3回目終了後7～13か月の間隔をおいて1回接種、1歳以上	
定期	小児用肺炎球菌 (13価)	不活化ワクチン	生後2か月～生後60か月(5歳)未満	[接種開始] 生後2か月～7か月未満	↓	↓	↓							↓		初回 3回 追加 1回	1回目接種後27日以上の間隔をおいて2回目を接種(3回目も同様) ※初回3回は、生後12か月に至るまでの間に接種 3回目終了後60日以上の間隔をおいて生後12か月から生後15か月に1回接種	
定期	4種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ	不活化ワクチン	生後2か月～生後90か月(7歳6か月)未満	生後2か月～12か月未満 [3回目接種後] 生後12か月～18か月未満	↓	↓	↓							↓		初回 3回 追加 1回	1回目接種後20日～56日の間隔をおいて2回目を接種(3回目も同様) 3回目終了後6か月以上の間隔をおいて標準的には生後12～18か月未満の間に1回接種	
定期	BCG	生ワクチン	1歳未満	生後5か月～8か月未満				↓								1回		
定期	麻しん風しん混合 (MR) ※麻しん、風しん	生ワクチン	生後12か月～生後24か月(1歳～2歳)未満	1歳になったらできるだけ早期に接種										↓		1回		
			小学校就学前の1年間	5歳～7歳未満 小学校就学前の1年間											↓		1回	令和5年度の対象者は、平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれの方
定期	水痘(水ぼうそう)	生ワクチン	生後12か月～生後36か月(1歳～3歳)未満	[1回目] 生後12～15か月 [2回目] 1回目接種後 6～12か月開ける										↓		2回	1回目終了後3か月以上、標準的には6～12か月の間隔をおいて1回接種	
定期	日本脳炎 ※2	不活化ワクチン	生後6か月～生後90か月(7歳6か月)未満	3歳											↓		初回 2回	1回目接種後6日～28日の間隔をおいて2回目を接種
				4歳											↓		追加 1回	2回目接種後6か月以上、おおむね1年の間隔をおいて接種