

予防接種の種類			対象年齢	標準的な接種年齢等	対象年齢 2か月 4か月 6か月 8か月 10か月 1歳 3歳 5歳 7歳	標準的な接種年齢※1 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳	接種回数	備考
定期	ロタウイルス	1価	生後6週～24週	[接種開始] 生後8週～15週未満	↓ ↓ ↓		2回	1回目接種後、27日以上の間隔を置いて、24週までに2回経口接種 ※初回接種は、生後14週6日までに行うことを推奨
		5価	生後6週～32週	[接種開始] 生後8週～15週未満	↓ ↓ ↓ ↓ ↓		3回	1回目接種後、27日以上の間隔を置いて、32週までに3回経口接種 ※初回接種は、生後14週6日までに行うことを推奨
定期	B型肝炎	不活化ワクチン	1歳未満	生後2か月～9か月未満	↓ ↓ ↓ ↓ ↓		3回	1回目接種後27日以上の間隔を置いて2回目を接種、3回目は初回から139日以上経過した後に1回接種
定期	小児用肺炎球菌 (15価、20価)	不活化ワクチン	生後2か月～ 生後60か月 (5歳) 未満	[接種開始] 生後2か月～7か月未満	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		初回 3回	1回目接種後27日以上の間隔を置いて2回目を接種(3回目も同様) ※初回3回は、生後12か月に至るまでの間に接種
							追加 1回	3回目終了後60日以上の間隔を置いて生後12か月から生後15か月に1回接種
定期	5種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ	1期	生後2か月～ 生後90か月 (7歳6か月) 未満	生後2か月～12か月未満	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		初回 3回	1回目接種後20日～56日の間隔を置いて2回目を接種(3回目も同様)
				[3回目接種後] 生後12か月～18か月未満	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		追加 1回	3回目終了後6か月以上の間隔を置いて標準的には生後12～18か月未満の間に1回接種
定期	BCG	生ワクチン	1歳未満	生後5か月～8か月未満	↓ ↓ ↓ ↓ ↓		1回	
定期	麻しん風しん混合 (MR)	1期	生後12か月～ 生後24か月 (1歳～2歳) 未満	1歳になったらできるだけ 早期に接種		↓	1回	
		2期	小学校就学前の 1年間	5歳～7歳未満 小学校就学前の1年間		↓	1回	令和7年度の対象者は、 平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれの方
定期	水痘(水ぼうそう)	生ワクチン	生後12か月～ 生後36か月 (1歳～3歳) 未満	[1回目] 生後12～15か月		↓ ↓	2回	1回目終了後3か月以上、標準的には6～12か月の間隔を置いて1回接種
				[2回目] 1回目接種後 6～12か月あける		↓ ↓ ↓		
定期	日本脳炎※2	1期	生後6か月～ 生後90か月 (7歳6か月) 未満	3歳		↓ ↓ ↓ ↓	初回 2回	1回目接種後6日～28日の間隔を置いて2回目を接種
				4歳		↓ ↓ ↓ ↓ ↓	追加 1回	2回目接種後6か月以上、おおむね1年の間隔を置いて接種